

# Objectif 5

## Améliorer la santé maternelle

X En Asie de l'Est, en Afrique du Nord et en Asie du Sud, la mortalité maternelle a diminué d'environ deux tiers.

X La moitié seulement des femmes enceintes dans les régions en développement reçoit le minimum recommandé de quatre visites pour des soins prénatals.


X Dans le monde, environ 140 millions de femmes mariées ou en union affirment qu'elles souhaiteraient retarder ou éviter une grossesse

### CIBLE 5.A

Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle

La mortalité maternelle a été réduite presque de moitié depuis 1990, mais reste bien en dessous de la cible OMD

Taux de mortalité maternelle, 1990, 2000 et 2010 (décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, femmes entre 15 et 49 ans)



Au plan mondial, le taux de mortalité maternelle a diminué de 47 % au cours des deux dernières décennies, passant de 400 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 1990, à 210 décès

---

la couverture pour les naissances en présence  
de personnel soignant qualifié avait augmenté





## Le besoin de planification familiale est atteint lentement pour un plus grand

---

**Les grossesses d'adolescentes sont dangereuses aussi bien pour la mère que pour l'enfant, et se maintiennent à des niveaux élevés dans de nombreuses régions en développement**

---

Une grossesse précoce augmente les risques pour la mère et son enfant. B